INDICAZIONI DIAGNOSTICHE: Diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale da H. pylori.

DURATA DEL TEST: 30 minuti. Durante lo svolgimento deve rimanere a riposo seduto, senza mangiare, bere, fumare né masticare gomme.

MODALITÀ DI ESECUZIONE:

1. Raccolta espirato basale.
2. Assunzione di un bicchiere di acqua nel quale sono stati disciolti 1 compressa da 100 mg di Expirobacter (^{13}C UREA) e la bustina da 1.4 g di acido citrico.
3. Raccolta espirato successivo dopo 30 minuti.

AVVERTENZE : La recente assunzione di antibiotici, composti del bismuto o inibitori della pompa protonica (omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo) può invalidare il Test.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Non presenza controindicazioni all'uso in gravidanza e durante l'allattamento.

Dichiaro di essere stato informato dello scopo e delle modalità dell'esecuzione del test.

Nome Paziente..... Cognome Paziente.....

Acconsento all'effettuazione del test ☐ Non acconsento all'effettuazione del test ☐

DATA…… FIRMA PAZIENTE…….

FIRMA MEDICO…….